

解題

卷之五  
正義  
解題

解體新書卷之三

若狭杉田玄白翼 譯

日本

同藩中川淳庵鱗 技

東都石川玄常世通參

官醫

東都桂川甫周世民閱

●胸并膈膜篇第十三

○夫胸者居體之中也其爲之者肋骨胸骨椎骨之相擁也是謂自頭莖下至季肋之橫膈膜

○解體新書

卷之三

○一

○屬之者有二條一者說屬內者一者說屬外者

○屬外者分之則

皮見于第六篇

乳其形圓而堆如機里爾狀在胸之兩旁皮覆焉是婦人之一應具也乳汁成焉未有婦人有兒而無乳汁者也其屬之者

乳頭居正中而起其頂有小孔不六則十也小兒得之能吸乳汁其

汁滿則先知於此。

為乳輸。乳頭居其中而似被之結束。於此也。婦人未嫁者其色美赤。其周圍煩也。

機里爾使之分利其汁也熟視之脂多圓焉。

乳汁管錯綜而相交脂亦滿其管外也。蓋此管者細小也。動脈與血脈之支別從而位之。

其筋在肋間見于第二十一十八篇

其骨胸骨缺盆骨肋骨椎骨也。見于

第五十一篇

胸膜二十一葉也。因著胸之裏面有血脈充於此。即腫。

橫膈膜向胸骨著季肋與椎骨是爲胸與腹之阻隔其所主者能順血進退呼吸兼位。肺胃之運化也。又婦人以之佐產子。

其膜之周圍有薄肉烏根又有筋幅之。

○解體新言

卷之三

○二

其 中一穴。平而如神經狀。名曰「鏡」。  
竅在「右」者。食道所穿。

其根著腰椎後之者。動脈血脈之所穿。

竅在「左」者。

食道所穿。

太幹及奇經管

○居內者

縱膈膜。二十一襲而共備。胸骨之後。一者圍心。向推骨而著。一者從肋骨膜分爲二。蒙隔兩肺。即所謂肺腫。

肺懸胸內兩側之上。見于第十四篇。

○解體新書

卷之三

心。在兩肺之間。見于第十五篇。  
奇經管。在脰之後。見于第二十一  
篇。

食道。在氣管與肺後。見于第二十  
篇。

○蓋胸者。主調諸居內者。調呼吸順血。

●肺篇第十四

○夫肺者。居胸之內。連心之左右。其狀如牛。私所。主者呼吸也。其形。脰之則似返。犧牛蹄狀。和一唐之俗。張本南。附。食科各科圖。卷之三。

○裏肺之二太業者縱膈膜也分之則

右肺之大葉

左肺之大葉左右各分裂而爲二或爲

三

○其下垂處寬其上緊相對著

肺系通於心

屬之者肋骨椎骨及縱膈膜也

土爲氣管從喉頭起與食道並經頭  
蓋直連肺細分之則

○解體筋書

卷之三

○四

喉頭連舌骨之處也屬之者有五軟骨

甲樣軟骨喉突門凹後凹上屬兩陽連舌骨與前凸處

指環軟骨

形如指環後長廣即喉頭背面的環狀甲樣軟骨伸

此骨與甲樣軟骨之中間呼吸孔也

披裂軟骨

喉管最小微小者附於甲樣軟骨上

與機里爾動搖之七對筋

從胸連甲樣骨筋者使會厭擊而下

從舌骨連甲樣骨筋者使會厭擊而

動

指環甲樣筋

音教有甲樣軟骨上端之下端上端與舌骨不完全合會厭亦軟骨也其附屬之者有七度

音教有甲樣軟骨上端之下端上端與舌骨不完全合會厭亦軟骨也其附屬之者有七度

音教有甲樣軟骨上端之下端上端與舌骨不完全合會厭亦軟骨也其附屬之者有七度

音教有甲樣軟骨上端之下端上端與舌骨不完全合會厭亦軟骨也其附屬之者有七度

音教有甲樣軟骨上端之下端上端與舌骨不完全合會厭亦軟骨也其附屬之者有七度

指環披裂下筋

指環披裂傍筋

以上三筋合會厭

披裂筋

以上二筋被

甲様披裂筋

被裂合封被

氣管爲岐而入于肺

氣管之前面者軟骨也形如環缺環其數二十

利屈伸便呼吸

氣管之後面者三葉也一者薄膜二

者薄肉三者小機里筋橫筋

其上之兩側有機里筋之大者若焉

○解體新書

卷之三

〇五

即名甲樣機里

肺管爲岐者直內于兩肺分而爲多支每端有小囊能使肺脹

○屬肺如私奔牛私狀者

肺之小囊者附肺管之支別其末爲多支每端脹之則如葡萄狀其動脈是通於心右方使血注入肺其血脉是使從心右方所受之血入於心左方也肺於是乎養焉

肺管之動脈及血脉者皆以養肺見于

第十六七篇

其膜是裏兩肺，

○蓋肺者以吸能脹。其所以脹者先受氣於氣管。次以傳其支別悉屬其小囊故也。其動脈血脈者主受心之右方血傳心之左方。形體虛滿者血才粘稠之物而為虛自乳管去肺大空受原氣故能空虛其能縮能脹者是以使血澄也。又其爲用者調言語太黏稠物也。

●心篇第十五

解體新書

卷之三

〇六

○夫心者一肉囊也挂胸內兩肺之間胞膜裏之能使血運行。

造制

雙合

其上大而著彼此

其下鏡而不與他附著

○其近之及屬之者

○縱膈膜見于第十三篇胸機里爾見于

第二十七篇

○心胞二襲而有光澤之膜也以之裏心

其間有液

翼按：加私巴兒曰：其液淡紅色，主

使心潤滑。

○有四之大脈分之則

血脈本幹見于第十七篇

肺動脈見于第十四篇

肺血脈見于第十四篇

動脈大幹見于第十六篇

○其全狀分之則

右耳

○解體新書卷之三

左耳左右各有所主

全形者細肉筋錯綜而成之  
又冠脈主養之

其右一方者薄而大

其左一方者厚於右方而狹長  
其中隔者以別左右

其裡面有小片肉襟簇  
其子去核之狀

三尖瓣在血脈所終之處

小和的樓私

和蘭人所  
有者

標榜在肺血

脉附之處

片月樣辨在動脈大幹及肺動脈之所起

○蓋心胞者主受涼氣於肺而滋心也

諸辨者主節血之出入而使其不妄行也

心者主運行血也。血者其原奇經之成者  
化育天地皆此之根也。故曰陽虛生陰謂通乎左之奇經之氣食消

動脉也。

見于第二十一篇音譜化于血。

運行而

歸心之右方也。其血上行而轉入兩肺見于第十四篇。其血又下心之左方再上

○解體新書

卷之三

行而入動脈大幹居其支別微細之所周流一身而無不居也。其血所居與血脉合經其支別微細之所會血脉大幹更而之下心之右方也。循環無端矣。心縮則血在心之耳也。當是時心擴開而脈辨開其血則入動脈大幹也。心脹則脈辨開而心擴開又當是時其耳所受之血及所貯之液共納心矣

○夫動脈者從心之左方起支別則蔓延一身也其微細而不可名狀者不舉于此矣○其支別可名者

其幹上行者名曰弓其別大者有三。一者心之冠脈當弓脈之下心辨之處。一者鳥胃脈在右缺盆骨下又其支別者從此至腕。

鳥胃內脉上行絡腦而蔓延

鳥胃外脈上行絡屬而至舌

一者左右趺盆骨下脈從此出而前行

○解體新書

卷之三

〇九

項脈循項後

助上脈行一下三之助上

乳脈其支別者下臂骨至腋

脈脈其支別者過膕臂至五一指之端

其幹下行者從此而蔓延

\*肺管脈從此別而養肺

助下脈從助間前行

橫膈膜脈別而貫於橫膈膜下連諸脈

胃脈之幹者在膈膜根間別而行左右其右行者

胃之右脉。循胃之右侧。

腸綱之右脈。循腸綱之右侧。

大機里膍脈。下而循大機里膍。

十二指腸脉。下而十二指腸。

脾脈。下而連脾。

肝脈。從此而入肝以養之。

其左行者。

胃之左脉。循胃之左侧。

腸綱之左脉。下而循腸綱之左侧。

腸胃之綱脉。其支別者各循腸與胃。

脾脈。別而下大機里膍與脾。

下膈膜之上脈。過下膈膜而入腸。

精脈。左右共下腎。

精脈。從此別男子者下。女子者下。

耶縷全西私。此謂男是也。人之

腰脈。向腰椎之側而住。

下膈膜之下脈。下而行於厚腸。

腸骨脈。下而行足。又其支別取原於此。

者

膝骨脈。交腸骨脈。分而下足。

陽骨內脈。即小腹之脈也。其支別者。  
下小腹循脾至陰股之内。陰具與脾  
脈之外。

○陽骨外脈。即大腹之脈也。其支別者。  
自陰股之外側。達股骨脈。至五指端。  
是皆取原於此者也。

○蓋動脈者主受血于心而傳。支別經絡以  
能周流養一身焉。

### ●血脉篇第十七

○夫血脉者。娘而無動。自一身動脈所盡之處。起其所起者微細也。以能交動脈微細者而受其血也。其所終者二大幹也。以能太會其血而送入心之右方也。蓋動脈者順行。血脈者逆行矣。

○連心二大幹者。

冠脈之相對處。

其上幹屬之者。

○奇脈在背肋之間。血脉二大幹之後。  
各有一支。左支爲脾。右支爲肺。

肺管脈。是受肺管動脈之血。以來於

此。

缺盆骨下脈。下於此者

鳥胃內脈。從胸來

鳥胃外脈。從頭之外側來

項脈

助上脈

乳脈。從乳下胸骨

筋脈。從頭莖來

肝骨脈。轉內與外而下肝骨

○解體新書

卷之三

肝脈。從其支別來

頭脈。是脈脈外廉之支別

肝脈。是脈脈內廉之支別

中脈。在肘之內廉為又之處也

脾脈。在手背近指之處

其下幹者。逆行血之所會也。其屬之者

橫膈膜脈

肝脈。受血於門脈

肺脈

精脉。左右各通腎故一名腎脈

精脈。右者連血脈之太幹。其左者直入。  
精原脈。

腰脈。從腰來。乃血脈所長。

膝骨脈。從膝骨脈之間來。

腸骨脈。其支別二也。共向內。

腸骨內脈。從小腹之下。陰股及膀胱

內側來。是其所會。

腸骨外脈。從太股及股骨脈之處來。

股骨脈。其支別可名者。

一曰筋脈。

二曰膝脈。

○解體新書

卷之三

○十三

三曰膀胱脈。

四曰肺脈。

五曰母脈。

○蓋血脈者。主受血於其絡脈微細之所。而會其太幹以納之於心右方也。細分其狀態。則

其一者。從動脈。

其二者。切交動脈所終而受其血。

其三者。設辨數數以送迎其血。見于第三篇。

其四者。其辨皆自能開闔。

其五者使血能运行其内

●門脈篇第十八

○夫步倭縷都亞氏兒此  
用此脉主進血出人。者十種之脈也  
在下膈膜之間連腹內諸部受其血。其所  
起微細而爲數支。其所終亦微細而爲數  
支。其質如血脈而無辨。其支入肝者與血  
脈微細者交也。其所起者如枝。其所終者  
如根全形恰似一樹木之倒懸矣。

○其所屬者

其支別反細絡者入肝而蔓延。蓋小兒  
之臍帶者從此成

其別者見于第二十七篇

幹其支別者入肝之門見于第二十四

篇

膽之二脈行膚

胃之右脈屬胃之右側

十二指腸脈在腸之初

此有支別之大者二

○解體新書

卷之三

○十四

其支左行而屬脾者

內營脈屬直腸。又其末別之所屬者

胃之左脈

腸網之左脈

胃之左方及腸網之脈

大機里胃脈

經脈屬脾與腸間

其支右行者

腸網之右脈

胃之右方及腸網之脈

解體新書 卷之三

○十五

下膈膜脈其支別不可數者皆從腸

出其相交所自爲輪郭

○蓋門脈者其用有二也受血如血脉出血  
如動脈其血者即水穀之所化是能養其所屬者自無歸心入肝則分利膽汁也且入肝而分利膽汁以佐動脈。又其態如動脈而無動如血脉而無辨其血逆行而續流也然婦人者凡之男子則急也

按武蘭加兒曰門脈者受從脾  
勝及下膈膜等所生之血蓋其血

元帶淡苦汁傳肝分利之則膽汁

全成也

又曰苦味所盡之血者傳血脉而以歸心也

●眼篇第十九

○夫腹者居體之下而嫌者也上著肋骨下至兩股

至兩股

至兩股

○解體新書

卷之三

三十六

偏焉別有脛度屬此見于第二十一

七篇

白條者在諸皮之下其間又有長者二條是筋根相合而成也

○包裹腹部者

外皮見于第六篇

五一對筋見于第二十一十八篇

并私沙屈是滑薄而二襲之膜也在小腹而包裹腸以能護焉其屬之者

膜下帶也詳至大乘氣包膜東有謂內膜也

膜裏下帶也詳至大乘氣包膜東有謂內膜也

膜裏下帶也詳至大乘氣包膜東有謂內膜也

皆包裏之。婦人者。經子官及圓脣皮。

後曲文股筋之所經。

腰推及腹骨者。見于第五篇。

賈按。此蘭加兒曰。并私涉屈者。起於腰椎之外側也。此既之者恐其

意也。

○居內者。

○解體新書 卷之三  
海而被透裏。外腹皮裏而被布于嘴上。胃肝脾下及絕滑。腸綱形如囊而二十一襲膜也。脂多生焉。上者前接脾胃及十二指腸。後至結腸。與太機里。下者寬大而圍太腹及膀胱。爲飲食消化之一助也。

○腸見于第二十篇。

○下膈膜。見于第二十一至二十二篇。

○胃在橫膈膜下而向左。見于第二十一至二十二篇。  
○肝肺繫右。見于第二十一至二十四篇。  
○脾在左。是當胃之後。見于第二十一至二十二篇。  
○大機里。爾在胃之下。見于第二十一至二十二篇。  
○兩腎在肝與脾之下。見于第二十一至二十五篇。  
○膀胱在小腹鍋骨之下。見于第二十一至二十五篇。

○陰器連膀胱見于第二十六篇血道與  
液道見于第十一及二十一篇

○蓋腹者主裏膈下之諸臟外者備皮膜內  
者佐腸與奇經運動且助呼吸與胎產利  
二便也

### ●腸胃篇第二十

○夫食道胃及腸者一之長管也起於頭莖  
經胸腹終於肛門其經之者四

一者膜樣

○解體新書 卷之三

○十八

二者筋樣

三者神經樣

四者褐色樣

○食道者在喉內氣管之後也其所起大而  
形如漏鉢從頭莖下經胸貫橫膈膜而後  
與胃連也其所起名咽此有三筋

一筋骨咽頭筋從稜骨起 以上二筋連咽  
咽頭筋從項起

封咽筋使咽閉

○胃者在肝脾之間其狀如囊即食道闊大

之兩側使之閉

之處也。其屬之者。

胃之上口。在左邊貫橫膈膜也。神經多居此故知寒熱。

胃底闊大之處也。熟視之則有附屬者。較及橫里爾。胃之液從此生。

胃之下口。其狀如蠻口。其屬此者

胃辨。懸腸之上。使胃之下口閉。

屬胃血道。短脈與冠脈也。見于第十六

及十八篇。

○腸者其長周迴體六矣。我百會玉會紅迴

解體新書

卷之三

○十九

曲折之處。相附著者下膈膜也。

○薄腸。在腹之中部。此一腸所據小腸即於厚一腸

十一指腸。其長如十一指橫徑接胃之下口直曲而從肋內向左腎下也。肺及太機里。爾汁入焉。見于第二十二及二十四篇。

和腸。多有結辨也。水穀至於此而漸消乃當肺部。其長手之十五矩也。門子之次一指為一矩度半指半寸之二十七矩。數至四指六寸

回腸。當小腹其長手之二十矩也。此腸

上而連厚腸。其所連者分之則

機鳥非奴私多言人謂是主使所內厚

腸之化物以之隔而不反下。

○厚腸圓薄腸。此一腸開百大其屬之者分之

則

盲腸其長無過四指橫徑。

小蟲一腸附盲腸之端。

其質變而一而津液參之者稱  
注管細之滋潤之治滌寒力之云生

綿腸上而傍腹之右側左轉而循胃之下返而下腹之左側其終如厄勒祭亞

ㄣ字尼勒祭亞至國一名屬附形已與和蘭同文字體少異即和蘭空和之字

○解體新書

卷之三

其長手之六矩也。其內多礫積其外有三十釐度

賈特武蘭加兒曰。綿腸者其形如罪甸之噬私字之左文也。蓋羅一句者古之國名。其國亡而其語存恐與今之厄勒祭亞同文也。質之其物則武蘭加兒所謂左文者為得。

直腸直從腰下至肛門其長無過二千手也然既無根故至中此腸所盡有三十筋分之則

閉肝門筋是使肝門閉此筋者主使太便忍且令其隨意出

一開肝門筋二是使肝門開

○蓋食道者主使飲食送下胃

胃者主饑飽且使水穀調和

腸者主消導水穀運行其精液兼佐之動化精粕作太便出焉其水穀之精液

名之曰竒經蠕動機

諸家機能存長吸呼呼吸脉搏循行於周身而氣血亦隨之運動

百大小腸中有二道自然運動二路律如

氣嚙即然舌端即機是氣嚙流暢

氣嚙

氣嚙流暢則氣血順流衝氣為消化飲食於胃

氣嚙

●下膈膜及通道篇第二十一

○解體新書卷之三

○二十一

○夫下膈膜者二葉而廣闊其形者圓其狀者如膜乃在腸與腰之間是亦一身所最者也其周迴之長自肺後至肝中橫紋四度

公文許

其周迴之長自肺後至肝中橫紋四度

○其所<sub>二</sub>在者從腰之第<sub>二</sub>椎起連腸也腸之外皮附著焉

○附其厚薄二腸之所者

其聚積之所弱而似加蠅亞古和蘭

○其屬之者

如花

其機里爾

其神經血道多屬於此也

下膈膜脈各自相續而爲連環見于

第十六及十八篇

浪道數條之細薄管而支別即如繩其色白在下膈膜二叢之間是奇縷出於腸者始于此而傳之機里爾上而入奇縷利白也蓋其管從腸出而達機里爾彼此相會而大者名曰一品浪道又從機里爾出再會而大者

名曰二品浪道二道共有一辨乃爲使奇縷不反下也又有水道者附屬之其奇縷與水共取原於腸及下膈膜液道者導之令同歸于心也

奇縷科曰是浪道之太會其形大而如囊在動脈太幹之後左腎之分奇縷與水相會之處也水道者見于第三十篇水與奇縷從此上奇縷管

奇縷管其形細長而嫩其狀如膜有辨多在焉其初從奇縷科曰起經胸長左

○其附屬者。小機里爾。及管與血道。其包之者膜也。

○其機里爾。是主分利血與水。其水者味酸。

加其小管。受其汁於機里爾以傳大管。其太管大。如麥稈在其正中而直連二十指腸。

其汁與膽汁會於此而以相和

不<sub>小</sub>膽汁與其汁相和。從此入二十一指腸。

○蓋木機里爾者。主分利血與水。且其汁者

解體新書

卷之三

化水穀製奇縷也

二十四

之脇肋屬動脈太幹又上轉而與玄缺  
盆骨下之血脈會

半月一辨是，在血與奇經相會之所。其所在者，奇經管之分也。

○蓋下膈膜者主雜談腸使物無凝滯於此也且下膈膜所以脈者以血道與液道在二葉腹間故也

液道者主受奇經於腸而傳奇經科曰

奇經科曰者主奇經與水和於此

奇經管者主使奇經上轉而至左缺盆骨


○解體新書 卷之三 ○二十三  
下之血脉與其血清化以盛其血歸養心焉

●太機里爾篇第二十二

○夫太機里爾者機里爾之太會者也在胃之下脾與十一指腸之間著腸網與下膈膜

○其色暗而微赤

○其形如太舌其長如手之八九指橫徑其幅二十指橫徑其厚一指



国立大学法人 東京医科歯科大学図書館  
Tokyo Medical and Dental Univ.